

Abortus

Carolina M Simanjuntak, S.Kep, Ns

- Normalnya usia gestasi 37-42 minggu.
- Kadang-kadang kehamilan berakhir sebelum waktunya.

- Abortus adalah pengeluaran hasil konsepsi kurang dari 20 minggu dgn berat janin < 500 gr.

- Kelainan pertumbuhan hasil konsepsi
- Kelainan pada plasenta
- Penyakit ibu

Etiologi

Lamanya kehamilan	Berat anak	Istilah
< 22 Minggu	< 500 gr	Abortus
22-28 Minggu	500-1000 gr	Partus Immaturus
28-37 Minggu	1000-2500 gr	Partus prematurus
37-42 Minggu	>2500 -4000 gr	Partus aterm (Maturus)
> 42 Minggu		Partus serotinus

- Kelainan pertumbuhan hasil konsepsi
- Kelainan pada plasenta
- Penyakit ibu

Etiologi

- Anak baru mungkin hidup didunia luar kalau beratnya mencapai 1000 gr atau umur kehamilan 22 minggu.

Patologi

Perdarahan dlm desidua basalis



Nekrosis jaringan



Hasil konsepsi terlepas sebagian /seluruhnya

Gestasi < 8 mgg

Gestasi 8-14 mgg

Abortus
↓
komplit
inkomplit

abortus



perdarahan banyak

- Abortus spontan terjadi dgn sendirinya , merupakan 20% dari semua abortus
- Abotus provokatus (disengaja, digugurkan : 80% dari semua aborttus

Klasifikasi

Abortus provocatus



A. Provocatus therapeutik

A. Provocatus Criminalis

Abortus

Abortus imminens

Abortus insipiens

Abortus incompletus

Abotus Completus

Missed Abortion

Abortus Habitualis

Abortus secara klinis

- Peristiwa terjadinya perdarahan dari uterus pada kehamilan sebelum 20 minggu, dimana hasil konsepsi masih dalam uterus dan tanpa adanya dilatasi serviks

Abortus imminens



AKPER HKBP BALIGE

- Perdarahan sedikit (dapat berupa bercak)
- Kram perut bawah
- Pembesaran uterus sesuai gestasi
- Pada pemeriksaan dalam belum ada pembukaan
- Tes kehamilan positif

Gejala

- Jangan melakukan aktivitas fisik berlebihan atau hubungan seksual
- Jika perdarahan :
 - Berhenti : lakukan ANC seperti biasa
 - Terus berlangsung : nilai kondisi janin (USG) lakukan konfirmasi kemungkinan adanya penyebab lain

Penanganan



Abortus imminens masih ada harapan bahwa kehamilan masih berlangsung terus
Tetapi prognosis menjadi kurang baik bila perdarahan berlangsung lama

- Peristiwa perdarahan uterus pada kehamilan sebelum 20 minggu dgn adanya dilatasi serviks tetapi hasil konsepsi masih dalam uterus.

Abortus insipiens

- Tanda

- Perdarahan banyak, kadang keluar darah
- Nyeri atau kram perut karena kontraksi kuat
- Akibat kontraksi terjadi dilatasi serviks (pembukaan)
- Uterus sesuai usia kehamilan



Abortus insipiens

- Karena boleh dikatakan pasti terjadi abortus untuk mempercepat pengosongan rahim diberi oksitosin
- Untuk mengurangi nyeri karena his dapat diberikan sedativa
- Jika dgn pemberian oksitosin tidak berhasil dapat dilakukan curettage

Penanganan

- Jika sebagian hasil konsepsi telah lahir tetapi sebagian tertinggal di dalam uterus disebut abortus incompletus

Abortus incompletus

- Perdarahan banyak dgn pengeluaran jaringan , perdarahan berlangsung terus
- Terjadi dilatasi serviks

Gejala penting

- Abortus incompletus harus segera dibersihkan dgn curettage.
- Selama masih ada sisa-sisa plasenta akan terus terjadi perdarahan

Penanganan

- Jika hasil konsepsi lahir dgn lengkap

Abortus complit

- Nyeri perut bawah
- Serviks akan menutup apabila hasil konsepsi sudah lahir komplet

Tanda

Penanganan

- Tidak perlu evakuasi lagi (karena sudah lahir lengkap)
- Observasi untuk melihat perdarahan yg banyak
- Pastikan untuk tetap memantau kondisi ibu setelah penanganan
- Apabila terdapat anemia sedang, berikan tablet sulfat ferrous jika berat berikan transfusi darah

- Keadaan dimana telah terjadi 3x abortus yg spontan berturut-turut

Abortus Habitualis

- Memperbaiki keadaan umum
- Istirahat yg cukup
- Pemberian makanan bergizi

Penanganan

- Missed abortion adalah kematian janin berusia sebelum 20 minggu, tetapi janin yang telah mati itu tidak dikeluarkan selama 8 minggu atau lebih.

- Uterus tidak membesar, malahan makin mengecil
- Payudara mengecil kembali
- Tes kehamilan negatif

Gejala klinis

- Biasanya keadaan ini berakhir dgn abortus spontan

- Pemberian oksitosin segera setelah kematian janin dipastikan
- Dgn pemberian oksitosin diharapkan akan terjadi abortus spontan
- Bila tidak terjadi abortus sekurang-kurangnya terjadi pembukaan yg memudahkan curettage

Penanganan